

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О ВИЧ/СПИДе

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) инфицирует клетки иммунной системы

Инфекция приводит к прогрессирующему истощению иммунной системы, разрушая способность организма давать отпор некоторым инфекциям и другим болезням. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) относится к самым поздним стадиям ВИЧ-инфекции, на которых появляются какие-либо из более чем 20 оппортунистических инфекций или характерных для этой болезни раковых заболеваний.



ВИЧ передается несколькими путями

ВИЧ может передаваться следующими путями:

- незащищенный секс с инфицированным человеком;
- переливание зараженной крови;
- использование зараженных игл, шприцев или других острых инструментов;
- передача от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

В мире 35,3 миллиона человек инфицированы ВИЧ

В 2013 году 35 [33,2–37,2] миллионов человек были инфицированы ВИЧ и 3,2 [2,9–3,5] миллиона из них — дети. Подавляющее большинство людей с ВИЧ живет в странах с низким и средним уровнем дохода. По оценкам, 2,1 [1,9–2,4] миллиона человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2013 году.

ВИЧ является основной инфекционной причиной смерти в мире

По оценкам, на сегодняшний день от ВИЧ/СПИДа умерло 39 миллионов человек, а в 2013 году — 1,5 [2,9–3,5] миллиона человек.

Есть несколько способов предотвращения передачи ВИЧ

- практика безопасного секса с использованием презервативов;
- тестирование и лечение инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ;
- воздержание от потребления инъекционных наркотиков или, в случае их потребления, использование всегда новых и одноразовых игл и шприцев;
- обеспечение того, чтобы кровь или продукты крови были протестированы на ВИЧ.

Комбинированная антиретровирусная терапия (АРТ) предотвращает репликацию ВИЧ

При прекращении репродукции вируса иммунные клетки организма способны жить в течение более длительного времени, обеспечивая защиту организма от инфекций. Если ВИЧ-позитивный партнер в паре получает АРТ, вероятность передачи ВИЧ сексуальным путем снижается на 96%.

В конце 2013 года 12 миллионов ВИЧ-позитивных людей имели доступ к АРТ

Достижение цели по обеспечению лечения для всех остается огромной проблемой. В соответствии со сводными руководящими принципами ВОЗ 2013 года, около 85% всех людей с ВИЧ отвечают критериям для получения АРТ.

По оценкам, 3,2 миллиона детей инфицированы ВИЧ

По данным за 2013 год, большинство из этих детей живет в Африке к югу от Сахары и были инфицированы своими ВИЧ-позитивными матерями во время беременности, родов или грудного вскармливания. Около 240 000 тысяч детей были инфицированы ВИЧ в 2013 году.

Передача инфекции от матери ребенку почти полностью предотвратима

В 2013 году 7 из 10 беременных женщин с ВИЧ — 970 000 — получали АРВ для предотвращения передачи вируса от матери ребенку.

ВИЧ является основным фактором риска развития активной формы туберкулеза

В 2013 году среди людей с ВИЧ произошло примерно 360 000 случаев смерти от туберкулеза.